

SMICHAE

www.sowonbio.co.kr

PN2

sowonbio



SMC HANE

- 01 제품 소개
- 02 주요 성분 및 효능
- 03 사용 방법 및 용량
- 04 사용 주기
- 05 사용 전후 주의 사항

1.제품 소개



구분	내용
제품명	SMICHAE PN 2
포장단위	2.5ML /1BOX
보관 방법	직사광선을 피해 상온에서 보관(2~25도 사이)
주요 성분 및 함량	Polynucleotide2%,Sodium Hyaluronate1%
사용 부위	얼굴 ,손등,목등

2.제품 주요 성분 및 효능

PN 2%

HA 1%

이런 분들에게 추천합니다

- 속건조가 심한 경우
- 피부장벽이 무너진 경우
- 피부가 푸석하고 윤기가 없는 경우
- 피부의 잔주름, 모공, 예민함이 걱정되는 경우

• PN 효능

탄력도 상승

모공 축소

피지 및 각질 감소

피부결 및 피부톤 개선

피부결 및 피부톤 개선

유수분 밸런스 회복

피부 보호막 재생

잔주름 개선

• HA 효능

수분 공급

피부 열화 예방 (피부 손상 예방)

피부 재생 촉진

3.사용 방법 및 용량

1.시술 부위마취 및 소독

사용 전 시술 부위를 소독하고 마취크림을 도포한다

2.니들 선택

손 주사 :**1.5mm** 니들 ,**4mm** 니들 (무통)

인젝터: 시술자와 환자의 상태에 따라 니들 선택한다

3.사용 방법 및 시술 간격

손 주사 :시술 깊이는 **1.0~4.0mm**이고 포인트당 **0.25~0.05mm**씩 /**0.5~2cm**간격으로 한번에 **1~2**실린지를 사용하는 것을 권장한다

인젝터: 포인트당 **0.05ml**를 설정하고 사용하는 것을 권장 하며 타 제품과 혼합해서 사용시 **5ml ~10ml**이내의 용량은 포인트당 **0.1ml**를 설정하고 사용하는것을 권장한다.

4.사용 용량

SMICHAE PN 2는 **PN + HA**가 혼합된 제품으로 점도가 있어서 한번 사용시 **1Syr/2.5ml**를 사용하는것을 권장하며 넥 포함해서 시술수 **5ml**까지 권장하며 타 제품과 혼합해서 사용 가능하다.

*주의:사용 방법은 시술자의 노하우에 따라 조절 될 수 있습니다

4.사용 주기

권장 사용 주기



*주의:사용 방법은 시술자의 노하우에 따라 조절 될 수 있습니다

5.사용 전후 주의사항

사용 전 체크 및 주의 사항

알레르기 병력	연어,생선 관련 알레르기 여부
임신.수유 여부	현재 임신 가능성,수유 중 여부
피부 상태	염증,감염,트러블 부위가 있으면 시술 시기 조정
통증 민감도	통증 걱정,긴장감,마취 선호 여부

사용 후 주의 사항

시술 당일	세안,메이크업 과도한 자극 주의
시술 일주일	과도한 운동,음주,싸우나 찌질방,강한 마사지,문지르기,각질 제거·스크럽·필링 주의
자외선 관리	보습과 자외선 차단은 필수
부작용 여부 체크	붓기가 점점 심해지는 경우,멍이나 부종이 오래 지속되는 경우,엠보싱은 일시적 현상

Thank You

sowonbio

customercenter@sowonbio.kr

